

295 mm



Herbicida

ATRAZINA 90 WG MEZFER

Herbicida agrícola - Gránulos dispersables - WG

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingrediente activo:

Atrazina.....900 g/kg

6-chloro-N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine

Ingredientes aditivos:.....c.s.p 1 kg

REGISTRO NACIONAL ICA. No.1714
Titular del Registro: MEZFER DE COLOMBIA LTDA.

CONT.
NETO: **1 Kg**

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

No lote:

Formulado por:
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co Ltd.
Binhai Economic Development Area,
Weifang Shandong 262737, China.
Tel +86-531-888 75222

Importado y distribuido por:
MEZFER DE COLOMBIA LTDA
K, 1,5 via Chia Cajicá Centro
empresarial Oxus
Ol, 206- Chia Cundinamarca


CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO
DANINO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

**NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA
CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE
ANIMALES DOMÉSTICOS
CAUSA IRRITACIÓN MODERADA A LOS OJOS**

ATRAZINA 90 WG MEZFER no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas. Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y **"No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación"**. Durante las aplicaciones terrestres **"Utilice ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada"** además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para herbicidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión. **"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón"**, en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

"Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta".

- **Si el producto fue ingerido:** y la persona está CONSCIENTE En caso de ingestión, si la persona está consciente hacer ingerir gran cantidad de leche, clara de huevo, solución de gelatina y si no hay nada de esto disponible, 1 ó 2 vasos de agua e inducir el vómito. Evitar luego la ingestión de alcohol. Si la persona esta INCONSCIENTE no le haga vomitar ni administre nada por la boca.
- **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada. Remover a la persona afectada al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial. Avisar al personal médico.
- **Si se absorbió por piel:** Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambiarlo de ropa mantenerlo en reposo y abrigado
- **Si el producto cayó en los ojos:** Lavar por 15 minutos con abundante agua corriente levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.

La Atrazina no tiene un antídoto específico.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM: 01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.
En Bogotá comunicarse con el Teléfono: 288 6012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

"Respetar las franjas de seguridad con relación a los cuerpos de agua".
"Extremadamente toxico para organismos acuáticos".

En caso de derrame, recoja y deseché acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación de **ATRAZINA 90 WG MEZFER**, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado. Evite contaminar con **ATRAZINA 90 WG MEZFER** las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre.

No contamine pozos, lagunas, ríos u otras fuentes de agua con los desechos de la aplicación, ni con los envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

Tóxico para aves: no contaminar los hábitats de estos organismos con sobrantes de la aplicación y/o con otros residuos del herbicida.

Tóxico para organismos acuáticos: evite contaminar fuentes de agua con sobrante de mezcla, aguas de lavado de equipos de aplicación o de protección personal.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su envase original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO".

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Cambiarla por 20/05/2020



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

ATRAZINA 90 WG MEZFER es absorbida por las raíces, pero también por las hojas de las malezas, inhibiendo la fotosíntesis y controlando principalmente malezas dicotiledóneas (hoja ancha) y algunas gramíneas (monocotiledóneas). Estas características su compatibilidad con cultivos recomendados permiten elegir el tiempo de aplicación entre la preemergencia temprana. Puede ser aplicado en preemergencia al momento de la siembra o a la emergencia temprana de malezas, actúa principalmente por las raíces.

| CULTIVO | MELAZAS QUE CONTROLA | DOSIS | PC | PR |
|---------|--|--|------|---------|
| Maíz | Lengua Vaca - Rumex crispus Llantén - Plantago major Rábano - Raphanus sativus Carretón - Medicago polymorpha Kikuyo - Pennisetum clandestinum Corazón herido - Polygonum mepalense | 1.4 kg/ha Una aplicación por ciclo de cultivo | N.A. | 0 horas |

PC: Período de carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PR: Período de reentrada: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

N.A.: No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar las aplicaciones de **ATRAZINA 90 WG MEZFER** Cuando las malezas tengan crecimiento activo (2-3 hojas) y en los primeros estados de crecimiento del MAÍZ (4-5 hojas MAÍZ). El terreno debe estar bien preparado (mullido) y una humedad adecuada (capacidad de campo). Las malezas en periodo de activo crecimiento en pos-emergencia temprana favorecen la eficacia biológica. Se recomienda hacer una sola aplicación por ciclo de cultivo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Para la aplicación por medio de equipo terrestre utilizar un volumen de agua de 200L.

Calibre bien los equipos y asegure un tamaño y distribución de gotas uniforme.

Se recomienda aplicar con boquillas de abanico plano a una presión de 40 a 50 psi.

Al aire libre, diluir la dosis del producto en la mitad del volumen de agua, haciendo un triple lavado del envase.

Completar el volumen con agua agitando constantemente hasta obtener una mezcla homogénea.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

ATRAZINA 90 WG MEZFER Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de hacer la mezcla definitiva. Este herbicida no es fitotóxico al cultivo cuando se aplica siguiendo las indicaciones presentadas en esta etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



445 mm