

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

**NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO**  
**MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS**  
**CORROSIVO CAUSA DAÑO IRREVERSIBLE A LOS OJOS ¡PROTEJASE!**  
**EVITA CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA**

Este fungicida no debe aplicarse cuando haya vientos fuertes para evitar daños a cultivos susceptibles, ni en horas de elevadas temperaturas.  
Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y "No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación".

Durante las aplicaciones terrestres "Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas" además equipo de protección completo: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para pesticidas. Evite caminar dentro de la neblina de aspersión.

"Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón", en caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

"Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado".

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Síntomas de intoxicación incluyen irritación, mareo, vómito, diarrea, debilidad. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta".

**Contacto con los ojos:** Lávelos con agua limpia por al menos 15 a 20 minutos hasta que la irritación disminuya. Consiga atención médica rápidamente.

**Contacto con la piel:** Retire la ropa y zapatos contaminados inmediatamente. Lave fuertemente con agua y jabón la zona afectada. Consiga atención médica.

**Inhalación:** Inmediatamente traslade la víctima a un lugar con aire fresco, mantenga a la per zona en reposo y vigile la respiración. Consiga atención médica.

**Ingestión:** No induzca el vómito, Enjuague la boca del paciente con agua y déjelo en reposo. Nunca suministre nada por vía oral a una persona inconsciente. Busque atención médica inmediata.

**Guía para el médico:** NO existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 800 09 16012** Fuera de Bogotá. En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

"Extremadamente tóxico para organismos acuáticos"

"Respetar las franjas de seguridad con relación a los cuerpos de agua"

"No contamine fuentes de agua"

En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación de **DIFENOCONAZOLE 250 EC MEZFER**, para la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evite contaminar con **DIFENOCONAZOLE 250 EC MEZFER** las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para aplicaciones terrestres y aéreas del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 y 100 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras.

#### ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). Siempre mantenga el producto en su empaque original. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar con los desechos, envases, residuos o aguas de lavado del equipo de aplicación.

**DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.**

Fecha de Aprobación ICA: 02/09/2021



## Fungicida

# DIFENOCONAZOLE 250 EC

## MEZFER

Fungicida Agrícola – Concentrado Emulsionable - EC

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

**Ingredientes activo:**

Difenoconazole.....250 g/L

3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)

-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

Registro Nacional ICA No. 1707

Titular del Registro: CROP CARE COLOMBIA SAS

CONT. **1 LITRO**  
NETO:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

No lote:

Formulado por:  
**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL Co. Ltd.**  
Binhai Economic Development Area, Weifang,  
Shandong 262737, China.

Importado y distribuido por:  
**CROP CARE COLOMBIA SAS**  
Cra 7, No 156-68 Piso 5  
Bogotá DC- Colombia

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

**DIFENOCONAZOLE 250 EC MEZFER** es un fungicida sistémico a base de difenoconazol, recomendado para la prevención y el control de (*Alternaria solani*) en el cultivo de tomate.

**DIFENOCONAZOLE 250 EC MEZFER** es rápidamente absorbido por la planta y actúa sobre el crecimiento subcuticular de las hifas en los tejidos afectados. El desarrollo de los conidios así como su virulencia y habilidad también son claramente afectadas. **DIFENOCONAZOLE 250 EC MEZFER** detiene el desarrollo de los hongos interfiriendo con la biosíntesis de los esteroides de las membranas celulares del patógeno. Aun cuando el modo de acción de **DIFENOCONAZOLE 250 EC MEZFER** tiene características tanto protectantes como curativas se recomienda aplicarlo cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	PC*	PR**
Tomate ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	Gota Temprana ( <i>Alternaria sp.</i> ),	0.25 L/ha	7 días	4 horas

\* **PC: Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. \*\***PR: Período de Reentrada:** Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido. Una vez finalizado el mismo podrán reingresar utilizando elementos de protección personal, como pantalón largo, camisa manga larga, calzado cerrado; para las labores que impliquen contacto con las manos con el área tratada, se debe usar adicionalmente guantes y en ambientes confinados (Invernaderos) respirador o mascarar.

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar preventivamente con el inicio de los primeros síntomas cuando las condiciones ambientales favorezcan la enfermedad. Debe usarse en lo posible como tratamiento preventivo y alternado con otros fungicidas de diferente modo de acción. Debe evitarse dosis reducidas (subdosis) del producto. Los mejores controles fungicidas se obtienen cuando las aplicaciones se realizan preventivamente, en etapas iniciales del desarrollo de la enfermedad por lo que el monitoreo de la enfermedad en campo es esencial a la decisión de aplicación y al manejo integrado de la misma.

#### EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Use el volumen de agua requerido según el desarrollo del cultivo. Use boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. Volumen de aplicación 200 L/ha. Los caldos de aspersión deben prepararse solo inmediatamente antes de su aplicación y no deben guardarse para el día siguiente.

#### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. Debido al gran número de variedades de rosas que existen, se recomienda en caso de duda y sobre todo para variedades nuevas, hacer un ensayo en pequeña escala para observar fitocompatibilidad.

No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas.

#### INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II  
MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑO**

